

附件七 環境用藥藥效試驗測試生物種類及條件

試驗生物	種類	中英文 學名	性別	品系	代數	年齡	測試 條件
蚊成蟲	白線斑蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	或						
	埃及斑蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	或						
蚊幼蟲	熱帶家蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	或						
	地下家蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	或						
蚊成蟲	白線斑蚊	○		○	<10	3-4 齡	
	或						
	埃及斑蚊	○		○	<10	3-4 齡	
	或						
蚊幼蟲	熱帶家蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	或						
	地下家蚊	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	未吸血
	或						
蠅成蟲	普通家蠅	○	雌	○	<10	羽化 3-7 日	
蠅幼蟲	普通家蠅	○		○	<10	3-5 齡	
蟑螂	美洲蟑螂	○	雌/雄	○		成蟲△	
	德國蟑螂	○	雌/雄	○		成蟲△	
跳蚤	貓蚤	○		○		成蟲	未吸血
	或						
跳蚤幼蟲	鼠蚤	○		○		成蟲	未吸血
	或						
白蟻(室內)	貓蚤	○		○		2-3 齡	
	或						
白蟻(室內)	鼠蚤	○		○		2-3 齡	
	或						
白蟻(室內)	家白蟻	○		○		工蟻	
	或						
白蟻(室內)	黑翅土白蟻	○		○		工蟻	
	或						
螞蟥	不限種類	不限種類		○		工蟻	
	及品系	及品系					
火蟻△	不限品系	不限品系					
鼠類	溝鼠	○	○	○	<10	成鼠	
	或					(>200g)	
鼠類	屋頂鼠	○	○	○	<10	成鼠	
	或					(>100g)	
台灣缺喙 (小黑蚊)	○	○	雌	○			
蟻蠓幼蟲(小黑 蚊幼蟲)	○	○		○			
塵蟎	美洲室塵蟎	○					
	及						
塵蟎	歐洲室塵蟎						

		○			
果蠅成蟲	紅果蠅	○	○	<10	1-3 齡
蛾蚋		○	○		

說明：

(1)○：必備資料。

(2)△：火蟻試驗使用昆蟲生長調節劑（IGR），必須使用火蟻幼蟲或蟻后；蟑螂殘效試驗使用昆蟲生長調節劑（IGR）、餌劑藥效試驗，必須使用 3 齡以上幼蟲。